

столько велика, что трупы, хотя бы большихъ животныхъ (напр. ословъ), не гниютъ, но высыхаютъ и притомъ довольно скоро.

Въ заключеніе настоящей главы сдѣлаю нѣсколько выводовъ отно- Общіе выводы  
сительно пролета птицъ какъ на Лобъ-норѣ, такъ и вообще въ бас- изъ наблюдений  
сейнѣ Тарима<sup>1)</sup>.

Главную характерную черту этого пролета весною составляетъ раннее появленіе большихъ стай водяныхъ птицъ и долгое ихъ здѣсь пребываніе. То и другое обусловливается теплымъ климатомъ Таримской котловины и обилиемъ, по крайней мѣрѣ на Лобъ-норѣ, пищи (солянокъ) для громадной массы утокъ и гусей. Въ началѣ марта они быстро отлетаютъ на сѣверъ; лишь небольшое сравнительно число, да и то не всѣхъ видовъ, остаются на гнѣзденіе. Помимо водяныхъ птицъ, представители другихъ отрядовъ пернатаго царства бываютъ при пролетѣ на Лобъ-норѣ, а по многимъ даннымъ и на всемъ Таримѣ, большую частью въ самомъ ограниченномъ количествѣ. Тому причиною вѣроятно служать, помимо трудности перелета для слабыхъ пташекъ черезъ высокое нагорье Тибета, недостатокъ въ Таримской котловинѣ для нихъ корма (мало болотъ, мало насѣкомыхъ, нѣть ягодъ и пр.) и мѣсть удобныхъ для отдыха, а также пыльные бури, господствующія здѣсь въ теченіе болѣе поздней весны. Нѣкоторые обыденные виды какъ-то—*бекасъ* (*Scolopax gallinago*), *чибесъ* (*Vanellus cristatus*), *журавль спрытый* (*Grus cinerea*), *журавль малый* (*Grus virgo*), *турухтанъ* (*Machetes pugnax*), *улитъ прудовой* (*Totanus stagnatilis*), *улитъ темный* (*Totanus fuscus*), *камнешарка* (*Strepsilas interpres*), *бульший аистъ* (*Ciconia Boyciana*), *чепуроволочекъ* (*Ardeola minuta*) вовсе не показываются на Лобъ-норѣ, по-крайней мѣрѣ весною<sup>2)</sup>. При томъ за исключеніемъ четырехъ первыхъ видовъ остальные ни разу не были найдены нами во всей Центральной Азіи; впервые же встрѣчены въ Хотанѣ на осеннемъ пролетѣ. Такимъ образомъ Хотанская рѣка составляетъ для этихъ видовъ крайнюю восточную черту ихъ залета въ глубь Центральной Азіи<sup>3)</sup>.

Выше говорено было, что всѣ прилетныя на Лобъ-норѣ стаи водяныхъ птицъ являются съ западо-юго-запада изъ окрестностей Хотана

<sup>1)</sup> Здѣсь излагаются изъ нашихъ наблюдений лишь самые краткіе выводы, на сколько они служать для общей характеристики пролета въ описываемыхъ мѣстностяхъ. Детально о томъ же предметѣ будетъ объяснено при специальному описаніи центрально-азіатскихъ птицъ.

<sup>2)</sup> Весною 1877 г. нами были замѣчены на Лобъ-норѣ двѣ пары вѣроятно заблудившихся сѣрыхъ журавлей.

<sup>3)</sup> Въ Собственномъ Китаѣ эти виды опять встрѣчаются кромѣ *Machetes pugnax* и *Ardeola minuta*.