

немъ крайне сухомъ воздухѣ, но распадаются на слои, пересыпанные пескомъ и пылью. Лишь въ молодости тугракъ бываетъ нѣсколько красивѣе, въ особенности если растеть на солончаковомъ лёссѣ и получаетъ достаточно подземной воды; тогда быть можетъ онъ годенъ и для построекъ.

Въ тѣхъ же туграковыхъ лѣсахъ Черченъ-дарьи растутъ мѣстами скученно, мѣстами вразсыпную, два вида *тамариска* (*Tamarix laxa*, *T. elongata*; послѣдній преобладаетъ) и *Halostachys caspia*; затѣмъ всюду попадаетъ мелкій *тростникъ*, а на пескахъ *Karelinia caspica*. Въ лучшихъ мѣстахъ, по берегу самой рѣки и на небольшихъ островахъ кое-гдѣ ею образуемыхъ, встрѣчаются — *облепиха* (*Hippophaë rhamnoides*) и изрѣдка *джуда*; обыкновенны — *кендырь*, *джантакъ* и *солодка* (*Glycyrrhiza uralensis*); кое-гдѣ попадаетъ *Sphaerophysa salsula* и *дикая спаржа* (*Asparagus* sp.). Всѣ эти кустарники и травы густо покрыты лёссовою пылью, такъ что къ нимъ невозможно прикоснуться не испачкавшись. При томъ почва, здѣсь, какъ между кустами, такъ и въ туграковыхъ лѣсахъ, оголенная лёссовая глина съ пескомъ, то покрытая довольно твердою солонцеватою корою, то совершенно рыхлая какъ пепель. Подъ деревьями вездѣ валяются груды обломанныхъ бурями сучьевъ и кучи сухихъ листьевъ, которые звенятъ словно каменные, если ихъ катить сильный вѣтеръ. Словомъ, крайне безотрадную картину представляла растительность Черченской рѣки даже весною, въ первой трети апрѣля, когда мы здѣсь проходили. Несмотря на сильные жары (до $+30,8^{\circ}$ въ тѣни), зелени почти вовсе не было видно; лишь кое-гдѣ на влажныхъ мѣстахъ пробивались ростки тростника, да незамѣтно цвѣли тугракъ и облепиха ¹⁾. Взамѣнъ весеннихъ цвѣтовъ и бабочекъ въ обилии ползали скорпионы, въ тихую же погоду роились тучи комаровъ. Не лучше было и въ атмосферѣ: густая пыль постоянно наполняла воздухъ, застилала даль горизонта, а ближайшіе предметы окрашивала въ желто-сѣрый цвѣтъ; небо почти всегда было подернуто облаками, солнце же, если и проглядывало, то казалось матовымъ дискомъ, хотя все-таки жгло немилосердно.

Животная жизнь какъ на самой Черченъ-дарьѣ, такъ и по ея долину, несмотря на время горячаго пролета, въ особенности мелкихъ птишекъ, была весьма бѣдная. Изъ звѣрей намъ попадались довольно часто *хара-сульты*; кое-гдѣ видны были слѣды *мараловъ*; водятся здѣсь также *зайцы* и *песчанки* (*Gerbillus lepturus* n. sp.); вѣроятно есть *волки*

¹⁾ Со второй трети апрѣля началъ цвѣсти тамарискъ.