

ная, хорошо наѣзженная тропа по возможности обходить первые и по неволѣ пересѣкаетъ послѣднія. Путь, въ особенности для верблюдовъ, трудный, тѣмъ болѣе, что и подножнаго корма всюду недостаточно.

Первый переходъ въ 36 верстѣ привелъ насъ на р. *Мольджа*, ложе которой возлѣ горъ лежитъ на абс. высотѣ 7,700 футовъ и врѣзано въ наносную почву тройнымъ ярусомъ уступовъ, футовъ на 800 или даже на тысячу глубиною. Ширина этого ущелья внизу отъ 130—200 сажень; далѣе по теченію оно нѣсколько расширяется, а вмѣстѣ съ тѣмъ понижаются и высокіе берега. По распроснымъ свѣдѣніямъ, р. *Мольджа* вытекаетъ изъ двойной снѣговой группы Русскаго хребта, называемой *Кокъ-муранъ* и *Сарыкъ-колъ*. Пробѣжавъ отъ горъ верстѣ около 50 теряется въ солончакахъ. Возможно также, что описываемая рѣка приходитъ и съ плато Тибета. Въ началѣ мая мы нашли ея ширину при малой водѣ отъ 5—6 сажень и глубину въ 2—3 фута; мѣстами русло расширяется вдвое; лѣтомъ воды, конечно, гораздо больше; теченіе всегда очень быстрое. Дно, какъ самой рѣки, такъ и всего ущелья, усыпано крупными валунами; лишь изрѣдка выдаются небольшія площадки, густо заросшія кустами *мирикарии* (*Muricaria germanica* var. *squamosa*); здѣсь обыкновенно пробиваются и небольшіе ключи съ превосходною водою. Кромѣ того, кое-гдѣ въ описываемомъ ущельи растутъ: *хармыкъ*, *тамарискъ*, *лоза* (*Salix microstachya*?) и *суякъ* (*Lucium turcomanicum*), мѣстами *дырисунъ*; вразсыпную изрѣдка попадались намъ — *Cynomotorium coccineum*, *Glaux maritima*, *Carex* sp., *Oxytropis leucocyanea*? *Zygophyllum Rosowi*, *Asparagus* sp., *Ranunculus* sp., *Lactuca* sp. Словомъ, это было первое за всю нынѣшнюю весну мѣсто, гдѣ мы собрали 14 видовъ цвѣтущихъ растений. Однако окрестныя горы, состоящія изъ гранита и кремнистаго сланца, оказались совершенно безплодными.

Изъ птицъ въ томъ же ущельи встрѣтились: *кекликъ* (*Caccabis chukar*), *клушица* (*Fregilus graculus*), *славки* (*Sylvia minuscula*?), *сорокопуты* (*Lanius isabellinus*), *оляпки* (*Cinclus leucogaster*)¹⁾, а также запоздавшія пролетныя — *Totanus glottis*, *Totanus ochropus*, *Tringa Temminskii*, *Motacilla personata*. По вечерамъ надъ ключами кружили *летучія мыши*. Вообще какъ ни бѣденъ былъ растительною и животною жизнью описываемый уголокъ, онъ все-таки, среди окружающей пустыни, производилъ весьма отрадное впечатлѣніе. Можно было даже раскинуть бивуакъ на зеленой лужайкѣ, а глаза наши, въ конецъ намозоленные желто-сѣрымъ фономъ безплодныхъ равнинъ, пріятно отдыхали на свѣ-

¹⁾ У двухъ послѣднихъ видовъ молодые въ это время (5 мая) уже летали.