

меньше, нежели Мольджа, но, по словам туземцевъ, протекаетъ отъ горъ далѣе, такъ-что заходитъ въ большіе сыпучіе пески <sup>1)</sup>. На пересѣченіи описываемой рѣкою «нижней» Черченской дороги лежитъ урочище *Андерэ*, а верстахъ въ 25 отсюда ниже находится, какъ говорятъ, деревня, въ которой живутъ около 20 или 30 семействъ, занимающихся хлѣбопашествомъ.

Невдалекѣ отъ окраины Русскаго хребта, тамъ, гдѣ мы проходили, ущелье р. Бостанъ-тугракъ врѣзано въ почву пустыни на глубину отъ 700—800 футовъ. Внизу это ущелье имѣетъ не болѣе 50—60 сажень ширины и обставлено совершенно отвѣсными стѣнами отъ 200—300 футовъ вышиною. Эти вертикальныя стѣны состоятъ изъ валуновъ, мелкой гальки и песка, сцементированныхъ лёссомъ; иногда чистый лёссъ залегаеъ пластами и кубами въ нѣсколько сажень толщиною; мѣстами огромныя валуны на половину торчатъ изъ отвѣсныхъ стѣнъ, которыя кое-гдѣ даже нависли ко дну ущелья; нерѣдко тѣ же стѣны изборождены поперечными трещинами и вообще вездѣ представляютъ слѣды разрушенія. Дно описываемаго ущелья усыпано валунами и болѣею частью совершенно бесплодно. Лишь по берегу рѣки попадаются небольшія площадки *мирикарии*, да кое-гдѣ растётъ *хармыкъ*; травы для корма нѣтъ вовсе. Среди птицъ встрѣтились здѣсь еще не бывшія у насъ въ коллекціи, а именно: два вида *стренатки* (*Emberiza bruniceps*, *E. hortulana*) <sup>2)</sup>, *сорокопутъ* (*Lanius* sp.) и *пѣночка* (*Phylloscopus tristis*); кромѣ того казаки поймали, вѣроятно, заблудившюся *камышницу* (*Gallinula chloropus*), которая была отпущена обратно.

Опять съ большимъ трудомъ вылѣзли мы по разсѣлинамъ береговъ-Толанъ-ходжа, выхъ обрывовъ изъ ущелья р. Бостанъ-тугракъ и двойнымъ переходомъ сдѣлали 34 версты до новой такой же рытвины на р. *Толанъ-ходжа*. Дорога была хорошая, хотя болѣею частью, какъ и прежде, песчаная; большихъ поперечныхъ овраговъ не встрѣчалось. Тѣмъ не менѣе пришлось бросить еще четырехъ уставшихъ верблюдовъ, всего 19 отъ Лобъ-нора; на лицо осталось 45, да и тѣ болѣею частью были плохи. Пустынная равнина отъ горъ по прежнему была покрыта довольно высокими (2—3 фута) кустами *Artemisia*, *Eurotia?*, *Reaumuria* рѣже *Saragana* и *Calligonum*. Изъ звѣрей изрѣдка встрѣчались лишь *хара-сульты* и еще рѣже *зайцы*, а изъ птицъ только—*саксаульня сойки* (*Podoces Hendersoni*) и *черногорлыя чекканы* (*Saxicola atrogularis*), да кое-когда пролетали *больдуруки* (*Syrhaptus paradoxus*).

<sup>1)</sup> Мольджа не пробѣгаетъ въ пески потому, что ранѣе расплывается въ солончакахъ.

<sup>2)</sup> Найдена лишь единичнымъ экземпляромъ и болѣе этотъ видъ не встрѣчался.