

ныхъ продольно глубокими рѣчными ущельями. Почва здѣсь — наносъ, засыпанный лёссомъ. Благодаря обильному лѣтнему орошенію, предгорья въ полосѣ отъ 11—9 $\frac{1}{2}$  т. фут. покрыты хорошими лугами, привольными для пастбы скота; въ нижнемъ районѣ тѣхъ же предгорій, въ полосѣ отъ 9 $\frac{1}{2}$ —8 т. фут., гдѣ лѣтніе дожди уже слабѣе, растительность скудная. Рѣчки, пересекающія описываемый поясъ, текутъ, какъ сказано выше, въ глубокихъ (иногда до 1,000 футовъ) ущельяхъ. Съ удаленіемъ отъ высокихъ горъ эти ущелья мельчаютъ и расширяются; сами же рѣчки бѣгутъ спокойнѣе. По нимъ лежатъ на окраинѣ предгорій, и еще тысячи на двѣ футовъ по вертикалу внизъ отсюда, земледѣльческія деревни мачинцевъ. Далѣе до песковъ таримской впадины тянется покатая и бесплодная волнистая равнина, почва которой состоитъ изъ гальки съ пескомъ. На этой равнинѣ выбѣгающія изъ Кэрийскихъ горъ наиболѣе значительныя рѣчки протекаютъ только лѣтомъ при большой водѣ; въ остальные времена года онѣ прячутся въ почвѣ и выходятъ вновь на ея поверхность въ оазисахъ, лежащихъ вблизи сыпучихъ песковъ.

Верстахъ въ 30 къ сѣверу отъ подножія западной части высокаго Кэрийскаго хребта высится, словно передовой фортъ, изолированная горная группа *Тэкеликъ-тагъ*. Она протягивается отъ запада къ востоку и затѣмъ къ сѣверо-востоку болѣе чѣмъ на 50 верстъ, при наибольшей ширинѣ въ 20 верстъ; въ срединѣ поднимается выше снѣговой линіи. Впрочемъ, снѣга здѣсь немного, хотя, по словамъ туземцевъ, отъ него стекаютъ нѣсколько небольшихъ рѣчекъ. Дикость и труднодоступность составляютъ общій характеръ описываемыхъ горъ; ихъ крутые склоны сплошь изборождены скалами; притомъ нижній и средній пояса совершенно бесплодны. Лишь въ поясѣ верхнемъ появляются, какъ намъ сообщали, скудные луга, на которыхъ пасется скотъ мачинцевъ, живущихъ въ небольшомъ числѣ въ томъ же Тэкеликъ-тагѣ. Восточный уголъ этой горной группы омываетъ Аши-дарья, западный—р. Юрунъ-кашъ; обѣ онѣ текутъ здѣсь въ глубокихъ корридорахъ.

Флора.

Несмотря на обиліе лѣтнихъ дождей, Кэрийскій хребетъ бѣденъ своею флорою. Причинами тому, вѣроятно, служатъ: рѣзкій контрастъ, на небольшомъ сравнительно пространствѣ, сухой и жаркой пустыни съ громадными холодными горами, а также черезчуръ крутая стѣна этихъ горъ, на которыхъ узкіе по вертикалу пояса много различаются между собою относительно температуры и орошенія; при томъ послѣднее даже въ высокоомъ горномъ поясѣ обильно только въ лѣтніе мѣсяцы; остальное время года здѣсь господствуетъ засуха.