

томъ для этихъ луговъ замѣчается то же явленіе, что и для всѣхъ горныхъ лѣсовъ Центр. Азіи, именно: склоны горъ и ущелій, обращенные на сѣверъ, одѣты лучшею растительностью, нежели склоны южные, на которые прямо ударяютъ солнечные лучи.

Въ общемъ описываемый луговой раіонъ можетъ быть раздѣленъ на два пояса: *верхній* и *нижній*. Первый изъ нихъ принадлежитъ предгорьямъ въ полосѣ отъ $9\frac{1}{2}$ —11 т. фут. абс. высоты; второй поднимается вверхъ отъ 11 т. фут. до предѣла растительности. Выше 12 т. футовъ верхній луговой раіонъ переходитъ въ область розсыпей и скаль, съ которыми появляются и новыя травы. Преобладающими растительными видами въ нижнемъ луговомъ поясѣ служатъ: *овсянка* (*Festuca altaica?*), растущая отдельными кустиками, мало поѣдаемая скотомъ; *лапчатка* (*Potentilla bifurca*, *P. multifida*); *порѣзная трава* (*Leontopodium alpinum*), сиреневаго цвѣта *астрагалъ* (*Astragalus* sp.), розовый и малиновый *Oxytropis*, *тулявникъ* (*Sisymbrium humile*), *жеруха* (*Lepidium ruderale* var. *micranthum*), западно-тибетская *крапива* (*Urtica hyperborea*) по ущельямъ, обыкновенно возлѣ грудъ большихъ камней; *анемонъ* (*Anemone obtusiloba*) и *твердоцашечникъ* (*Androsace squarrosula* n. sp.), въ юлѣ уже отцвѣтшій. Въ верхнемъ поясѣ луговъ чаще другихъ встречаются: *мыжеръ* (*Polygonum viviparum*), палевый *твердоцашечникъ* (*Androsace sarmentosa* var. *flavescens*), крошечная *фиалка* (*Viola tianschanica*), желтый, рѣже розовато-лиловый *Oxytropis*, *Омфалодес* по скаламъ, палевый *мытникъ* (*Pedicularis versicolor*), мѣстами *астра* (*Aster alpinum*), *ежеспъянка* (*Echinospermum* sp.), голубовато-лиловая *герань* (*Geranium Pylzowianum*), *горичникъ* (*Lychnis opetala*) обыкновенно въ одиночку, кое-гдѣ *Lloydia serotina*; на мѣстахъ прежнихъ стойбищъ и нерѣдко въ лѣссовыхъ стѣнахъ старыхъ жилищъ гнѣздятся кучами *шампиньоны*. По розсыпямъ и возлѣ нихъ растутъ: *ревень* (*Rheum spiciforme*), *мышиякъ* (*Thermopsis alpina*), густыми площадками въ ложбинахъ между скаль; изрѣдка *курильскій чай* (*Potentilla fruticosa*), кустарничкомъ въ $\frac{1}{3}$ фута вышиною; *пижма* (*Tanacetum fruticosum?*), *валеріана* (*Valeriana dioica*), *блузоръ* (*Parnassia Laxmanni*), *Braya sinuata* n. sp., *Lagotis glauca*, *сухоребрица* (*Draba alpina*), *очитокъ* (*Sedum quadrifidum*), маленький *Oxytropis chionobia?*, *осока* (*Carex* sp.) на болѣе мокрыхъ мѣстахъ, *вероника* (*Veronica ciliata*), *лютикъ* (*Ranunculus affinis* var. *dasycarpa*), *камнеломки* (*Saxifraga* n. sp., *S. oppositifolia*, *S. sibirica*), *гентіаны* (*Gentiana tenella* var., *Gentiana* n. sp., *G. falcata*) и др.

и фауна сѣвер-
наго его скло-
на.

Хотя Кэрійскій хребеть помѣщенъ между двумя различными зоологическими областями—тибетской и таримской, притомъ поднимается до