

громадной абс. высоты, следовательно представляетъ (по крайней мѣрѣ на сѣверномъ склонѣ) разнообразныя физическія условія, но онъ бѣденъ, кромѣ флоры, и своею фауною. Причинами этого явленія опять-таки служатъ: черезчуръ дикій, недоступный характеръ верхняго пояса описываемыхъ горъ и узкій сравнительно районъ ихъ предгорій, болѣе удобныхъ для животной жизни; отсутствіе лѣсовъ и кустарниковъ; затѣмъ сильные почти непрерывные дожди лѣтомъ при значительно низкой температурѣ, такъ что мелкія птички не могутъ добывать себѣ и детямъ пищи (насѣкомыхъ), въ особенности при отсутствіи зерновыхъ травъ; наконецъ крупнымъ звѣрямъ мѣшаеть населенность предгорій, пастбища которыхъ лѣтомъ заняты скотомъ туземцевъ.

Въ общемъ сѣверный склонъ описываемаго хребта относительно своей фауны можетъ быть раздѣленъ на два пояса: *нижній*, обнимающій луговыя предгорья въ полосѣ отъ 8—11 т. фут. абс. высоты и *верхній*, къ которому относится альпійская область до вѣчныхъ снѣговъ. Изъ млекопитающихъ въ нижнемъ луговомъ поясѣ всего болѣе *тарабановъ* (*Arctomys himalayanus*); на зиму сюда приходятъ *арали* (*Ovis sp.*), откочевывающіе лѣтомъ въ верхній горный поясъ; встрѣчаются *лисицы* и, вѣроятно, *волки*; изрѣдка мы видали *летучихъ мышей*—и только. Замѣчательно, что мелкихъ грызуновъ вовсе неѣть на лугахъ предгорій¹⁾, хотя повидимому мѣстность для нихъ привольная. Весьма много на тѣхъ же лугахъ лѣтомъ домашнихъ животныхъ, въ особенности *барановъ* и *козъ*; въ меньшемъ гораздо числѣ встрѣчаются здѣсь *рогатый скотъ* (коровы, яки) и *ослы*. Лѣтомъ стада поднимаются по лугамъ изрѣдка до самыхъ розсыпей, на зиму же спускаются въ окраину луговой области; частью ихъ угояютъ для корма на низовья рѣкъ въ джангала. Въ верхнемъ горномъ поясѣ обитаютъ: *куку-яманъ* (*Pseudois Nahoor*) въ большомъ количествѣ; *барсъ* (*Irbis sp.*)—который охотится за куку-яманами, и какъ вездѣ, рѣдокъ; *хорекъ* (*Mustela alpina*); *пищуха* (*Lagomys rutilus?*) по розсыпямъ и валунамъ возлѣ рѣчекъ; наконецъ въ Тэкликтагъ водится, какъ намъ сообщали, *дикий козелъ* (*Capra sp.*), котораго неѣть въ хребтѣ Кэрійскомъ, но много по распроснѣмъ свѣдѣніямъ въ Карага-тагѣ.

Изъ птицъ въ поясѣ предгорія Кэрійскаго хребта чаще другихъ лѣтомъ попадаются: *горная щеврица* (*Anthus rosaceus*), *горная чечетка* (*Linota brevirostris*), *Podoces humilis*, *завирушка* (*Accentor fulvescens*), *блѣлая плисница* (*Motacilla personata*), *чекканъ* (*Pratincola indica*), *вьюрокъ*

¹⁾ Неѣть также здѣсь и зайцевъ.