

даже базаръ, бывшій въ тотъ день въ поселеніи Лобъ, оказался временно пустымъ.

Въ виду сильныхъ жаровъ, которые еще день въ день стояли, и невозможности при такой погодѣ идти внизъ по Хотанской рѣкѣ, мы рѣшили провести цѣлую недѣлю въ восточной окраинѣ оазиса Сампула на болотистомъ урочищѣ *Кутасъ*, гдѣ можно было съ удобствомъ наблюдать усилившійся теперь осенній пролетъ птицъ. Вышеназванное урочище лежитъ недалеко къ югу отъ большой кэрійско-хотанской дороги и представляетъ собою довольно обширную солончаковую площадь, обильно поросшую тростникомъ, мѣстами же покрытую болотами, образуемыми, какъ и при всѣхъ почти оазисахъ, стокомъ воды, ихъ орошающей. Только болота этого рода совершенно не походятъ на наши, ибо перегноя въ нихъ нѣтъ вовсе; взамѣнъ его лежитъ тонкій слой размокшей и липкой лёссовой почвы. Водянымъ и голенастымъ птицамъ здѣсь мало поживы; но онѣ при своихъ перелетахъ поневолѣ временно останавливаются на такихъ мѣстахъ, за неимѣніемъ лучшихъ. Кромѣ *тростника* (*Phragmites communis*), который всюду теперь жали туземцы для зимняго корма скота, на томъ же урочищѣ росли: стелящійся по влажной солончаковой глинѣ колючій *Crypsis aculeata*, *ситовникъ* (*Scirpus uniglumis*), *жабикъ* (*Juncus bufonius*), *сизозеленка* (*Glaux maritima*), *одуванчикъ* (*Taraxacum* sp.), *Triglochin palustre*, словомъ, обыкновенные представители здѣшней болотной флоры.

Наблюденіе
осенняго проле-
та птицъ.

Обращаясь собственно къ осеннему пролету птицъ, слѣдуетъ сказать, что общіе выводы относительно этого пролета уже изложены въ концѣ IX главы настоящей книги. Теперь можно дополнить ихъ лишь нѣкоторыми частностями, которыя, для избѣжанія разрозненности, будутъ обнимать наши наблюденія за всю осень 1885 года. Начну съ того, что еще въ концѣ іюля, въ Кэрійскихъ горахъ встрѣчены были нами нѣсколько пролетныхъ *удодовъ* (*Upupa epops*)¹⁾; отлетъ ихъ изъ котловины Тарима, вѣроятно, происходилъ во второй половинѣ августа и въ началѣ сентября. Въ первыхъ двухъ третяхъ августа въ пролетѣ замѣчено было только 6 видовъ: *славка* (*Sylvia minuscule*), которая часто попадалась по зарослямъ тамариска, обыкновенно была и на Хотанской рѣкѣ въ сентябрѣ; *бллая пчелница* (*Motacilla personata*), осенній пролетъ которой продолжался до половины, а единичными экзем-

¹⁾ Ранѣе того, еще въ первой половинѣ іюля, мы дважды встрѣтили (о чемъ было упомянуто въ предыдущей главѣ) въ тѣхъ же Кэрійскихъ горахъ, вѣроятно, случайно отлетавшихъ на югъ *кромшнпозъ* (*Numenius arquatus*?).