

плярами до конца сентября, встречалась также часто; *деревенская ласточка* (*Hirundo rustica*), отлететь которой, вероятно, происходило во второй половине августа и в начале сентября, но как-то было мало замечено; *береговикъ спрытый* (*Actitis hypoleucus*), *полуночникъ* (*Caprimulgus europaeus*) и *каменный дроздъ* (*Petrocincla saxatilis*)—встречались изредка единичными экземплярами.

Въ послѣдней трети августа пролетъ усилился. Въ особенности теперь летѣли голенастые, а въ концѣ мѣсяца (съ 26 числа) разные *утки* (*Anas boschas*, *A. acuta*, *A. querquedula*, и др.), стайки которыхъ большею частью пролетали прямо на югъ, мало останавливаясь на болотахъ возлѣ Сампула и Хотана; валовой утиный пролетъ происходилъ въ первой половинѣ сентября. Всего, кроме утокъ, которыхъ при высокомъ ихъ полете трудно было распознать, въ послѣдней трети августа наблюдалось въ пролетѣ 16 видовъ птицъ, а именно: *песочникъ Темминка* (*Tringa Temminckii*), единичный экземпляръ котораго еще въ концѣ июля былъ встрѣченъ въ Кэрійскихъ горахъ; два вида *ржанокъ* (*Charadrius xanthocephalus*, *Eudromias crassirostris*); четыре вида *куликовъ-улитовъ* (*Totanus glottis*, *T. glareola*, *T. fuscus*, *T. stagnatilis*), *зуекъ приморскій* (*Aegialitis cantianus*), два вида *бекасовъ* (*Scolopax gallinago*, *S. stenura*), *турухтанъ* (*Machetes pugnax*), *бульский аистъ* (*Ciconia Boyciana*), *чепура-волчекъ* (*Ardeola minuta*), *стрижъ башенный* (*Cypselus murarius*), *черногорлый чекканъ* (*Saxicola atrigularis*) и *сарычъ* (*Buteo vulgaris*). За исключениемъ утокъ, впрочемъ, также не особенно многочисленныхъ, изъ другихъ вышепоименованныхъ птицъ нѣсколько чаще встречались лишь—зуекъ приморскій, улитъ большой, улитъ болотный, турухтанъ, бекасъ и черногорлый чекканъ.

Та же бѣдность птичьего пролета продолжалась и черезъ весь сентябрь, проведенный нами до 7 числа въ Хотанскомъ оазисѣ, а затѣмъ въ пути внизъ по рр. Юрунъ-кашъ и Хотанской. Въ первой трети названного мѣсяца въ пролетѣ наблюдались: *спрая* и *белая цапли* (*Ardea cinerea*, *A. alba*), первая на болотѣ возлѣ Хотана въ достаточномъ числѣ, послѣдняя тамъ же лишь въ нѣсколькоихъ экземплярахъ; *сукалень чернохвостый* (*Limosa melanura*), однажды стадомъ болѣе сотни экземпляровъ; *водяная курочка* (*Ortygometra Bailloni*), *камнешарка сѣверная* (*Strepsilas interpres*) и *орланъ долохвостый* (*Haliaetus Macei*)—въ незначительномъ количествѣ. Во второй трети сентября по р. Юрунъ-кашъ на отлетѣ замѣчены: *черногорлый дроздъ* (*Turdus atrigularis*), въ большомъ числѣ также зимующій въ котловинѣ Тарима; нѣсколько маленькихъ стаекъ *обыкновенныхъ скворцовъ* (*Sturnus vulgaris*), часто