

ловых, полупрозрачных хохлаток (*Corydalis ledebouriana* и *Cor. schangini*) и еще более обширные и сплошные ковры трёхцветных тюльпанов (*Tulipa altaica* и *Tulipa silvatica* var. *tricolor*). Местами выходили из-под земли красивые, громадные листья ревеня (*Rheum leucorrhizum*)¹.

1 мая поутру в степи было уже жарко. На полдороге к Мало-Аягузскому пикету я увидел знаменитую в киргизской степи по народным легендам могилу Козы-Корпеча. Верхушка её была, к сожалению, отстрелена ядром из пушки. Кому понадобился такой акт вандализма, я не мог узнать. Степь была оживлена здесь вновь появившимися растительными формами². В этот день нам пришлось переезжать через вязкие солонцы, перемежавшиеся с песчаными пространствами. На некоторых из этих солонцов мы видели настоящие соляные инкрустации поваренной и глауберовой соли. На песчаных холмах были заросли саксаула (*Arthrohytum ammodendron*). Пески были оживлены несметным количеством черепах и ящериц, между которыми были и круглоголовые (*Phrynoscephalus*).

2 мая мы доехали очень рано поутру до Арганатинского пикета, на этот раз при совершенно ясной погоде, взобрались на Арганатинскую сопку, с которой вид был очень обширен. На западе в слегка туманной дали расстилалась поверхность озера Балхаша, а на востоке—отчасти окутанный облаками снежный гребень Семиреченского Алатау. Я пересел на лошадь и направился в экскурсию по низменной прибалхашской степи. Арганатинская группа и окрестная степь дали мне очень интересный сбор растений³.

¹ Кроме поименованных уже растений, были найдены мной здесь 30 апреля ещё следующие. из крестоцветных: *Megacarpaea laciniata*, *Leptaleum filifolium*, *Sysimbrium brevipes*; из семейства гвоздичных: *Silene viscosa*, *Sil. altaica*, *Arenaria longifolia*, *Cerastium maximum*; из семейства бобовых: *Caragana frutex*, *Astragalus unilateralis*, *Astr. arbuscula*, *Astr. lagocephalus*; из розоцветных: *Rosa platyacantha*; из зонтичных: колючий *Eryngium planum*; из сложноцветных: *Codonosephalum grande*; из пасленовых: *Physochlaena physaloides*; из семейства Scrophulariaceae: *Linaria odora*; из семейства Plumbaginaceae: *Goniolimon callicomum*; из солянковых: *Petrosimonia crassifolia*; из злаков: *Aristida pennata*; в самой же реке Аягузе собраны были мной следующие водные растения: *Myriophyllum verticillatum*, *Potamogeton natans* и *Pot. perfoliatus*.

² В этот день (1 мая) были найдены мной в приаягузской степи следующие интересные растительные формы: из бобовых—солодковый корень (*Glycyrrhiza aspera*), *Halimodendron argenteum*, *Astragalus buchtarmensis*; из сложноцветных—*Tragopogon ruber*; из бурашниковых—незабудки (*Myosotis silvatica*), покрывавшие обширные пространства своими яркоголубыми коврами, и *Rindera tetraspis*; из касатиковых—*Iris tenuifolia*, а из лилейных—замечательная и редкая *Fritillaria (Rhinopetalum) karelini*.

³ Вот список интересных растений, собранных мною в этот день (2 мая) в Арганатинской местности: *Thalictrum isopyroides*, *Meniocus linifolius*, *Farsetia spathulata*, *Astragalus stenoceras*, *Vicia subvillosa*, *Veronica cardiocarpa*, *Euphorbia rapulum*. Но всего интереснее было для меня нахождение в этот день в этой местности трёх ещё совершенно неизвестных растительных форм, получивших впоследствии названия: *Astragalus arganatiacus*, *Astr. chlorodontus*, *Hedysarum semenovi*. Они были описаны в F. Regel et. F. ab Herder, Enumeratio plantarum in regionibus cis-et transilensibus a cl. Semenovio anno 1857 collectarum (Bulletin Soc. Natur. Mosc. 1864, 1866, 1867, 1868, 1870, 1872).