

| 薬名 | 主能 | 用法 | 注意 |
|------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|
| 次硝酸蒼鉛(錠) | 下痢を止む | 一回二粒宛 | 一日三回多くも六回 単味にて用ゐ又健胃錠を用 量に加ふ |
| 甘汞(錠) | 下劑 | 一回二粒宛 | 一日一回稀に二回迄 屢用ゆるは宜しからず |
| 鹽酸「モルヒ子」(錠) | 胃痛腸痛を止む又下痢のとき 硝酸蒼と共用 | 一回半個又は一個 | 一日二回三回迄 成るべく制限して用ふ |
| 楊曹(錠) | 解熱劑但し主として「リウ マチス」の時 | 一回五粒 | 一日三回迄 連續用ふれば耳鳴起る |
| 鹽酸「キニー子」(丸) | 劑 | 一回五粒 | 「マラリヤ」には病の起る前 六時間一回、六時間後に 一回宛用ふ |
| 鹽酸加里(錠) | 含嗽劑 | 一合の水に二個又三個を 溶し用ふ | |
| 硼酸(錠) | 右に同じ又結膜「カタル」の 時に洗眼用 | 一合の水に二個を溶し用 ふ | |
| 亞鉛華澱粉 | あせも又は軽度の股ずれ等 に塗布す | | |
| 「アンチピリン」(錠) | 解熱劑 | 一回二、二個即ち〇、五又 は一、〇 | 一日二、三回 感冒の時に用ふ |
| 「ビツク」硬膏 | 切創、挫創「ニキビ、ネプト」 の類 | | |
| 「イヒチオール」「ラノリン」泥膏 | 虫に螫されたるとき創口を 絞りにて後塗布す | 「イヒチオール」一〇、「ラ ノリン」一〇、「サル チルサン」一三、〇四鉛華 澱粉各四〇、〇 | |
| 「クレオソート」 | 齒痛を止む | | |