

du premier par ses fleurs moitié plus petites, son étendard plus court relativement à la carène, ses fruits plus petits et plus obtus. Dans l'*O. glacialis*, le calice est couvert d'un mélange de poils blancs et de poils noirs.

23. *O. parviflora*, sp. nov.

(*Orobia*). — Planta tota viridis, vix subcanescens, pilis adpressis, haud densis; caulis abbreviatus, inferne hypogæus; stipulæ breviter coalescentes, glabræ vel glabrescentes, auriculis ovatis vel ovato-lanceolatis subacutis; folia-brevia, 2-3 cent. longa, foliolis 4-6 jugis, oblongo-lanceolatis, 6-7 mm. longis, vix acutis vel obtusis; pedunculus folia longe superans, tenuissime et adpresse puberulus; flores purpurei, in racemum brevem vel obovatum dense congesti, parvi (4-5 mm. longi), vexillo emarginato, carina breve mucronata; calyx brevissime tubulosus, 2 mm. longus, pilis nigris et albidis immixtis vestitus, dentibus triangularibus quam tubus 2-plo brevioribus; legumina subglobosa, subbilocularia, dense lanata, pilis albis et nigris vestita.

Hab. — Au delà du col de Ko-né-ding, sur le territoire anglais, 20 septembre 1892.

Espèce qui paraît bien caractérisée par ses folioles peu nombreuses, allongées et surtout par ses fleurs qui sont probablement les plus petites du genre et disposée en assez grand nombre en grappe courte et très serrée; le fruit mûr n'atteint pas 3 millimètres de diamètre.

24. *Potentilla Anserina* L., sp., 710.

Hab. — Bords du lac Pang-kong, 24 septembre 1892.

25. *P. bifurca* L., sp. 711; *P. moorcroftii* Wall., *Cat.* 1,014.

Hab. — Kâr Yâgdé, sur le Kéria daria, alt. 3,900 mètres, 12 août 1892.

26. *Chamærhodos sabulosa* Bunge in Led. *Fl. alt.*, I, 431.

Hab. — Mang-rtsé; 6-7 septembre 1892. Col entre le lac Pang-kong et Lou-kong.

27. *Rosa spinosissima* L.

Hab. — Bassin du Loutch. Nomen vernaculum: *Azghân* (rose sauvage).

CRASSULACEÆ

28. ? *Sedum tibeticum* Hook. fil. et Thomps. in *Journ. Linn. Soc.*, II, 96.

Hab. — Au delà du col Ko-né-ding, sur le territoire anglais, 20 septembre 1892.