

Espèce propre à la flore de la Mongolie et qui jusqu'ici n'avait pas été trouvée en dehors des limites de cette région. Sa station aux environs de Polour est la plus méridionale et la plus occidentale que l'on connaisse.

39. *Saussurea* Thoroldi Hemsl. in *Linn. Soc. Journ.*, XXX, p. 115, tab. 4.
Hab. — Vallée de l'Aksou.

Petite espèce à tige très raccourcie ou nulle ; les capitules très nombreux sont sessiles, groupés en glomérules au centre d'une rosette de feuilles ; les fleurs sont d'un rose vif ; les anthères violacées ou bleuâtres, exertes.

40. *Saussurea* Thompsoni C. B. Clarke, *Compos. Ind.*, 227.
Hab. — Vallée de l'Aksou.

M. Winckler, *Acta horti petrop.*, XIII, 244, a décrit, sous le nom de *S. amblyophylla*, une espèce très voisine du *S. Thompsoni* et peut-être identique avec elle.

41. *S. subulata* C. B. Clarke, *Compos. indicæ*, 226.
Hab. — Koutaslyk davân.

42. *S. sorocephala* Hook. et Thomps. in C. B. Clarke, *Compos. indicæ*, p. 226.

Hab. — Koutaslyk davân ; Aksou, dans le bassin du haut Kéria daria ; Hatamning davân.

Forme très petite ; quelques spécimens ne dépassent pas 2 centimètres ; les plus élevés atteignent 4 centimètres environ. Les fleurs sont blanchâtres ; l'aigrette formée de poils d'un gris d'acier, très plumeux, disposés sur un seul rang ou quelquefois avec quelques petites soies accessoires, très peu nombreuses.

43. *S. sorocephala*.

Var. *albicoma*. — *Setæ pappi albi* ; *corolla intense rosea* ; *folia demum glabrescentia*. — Forte species distincta.

Hab. — Hatam. davân.

44. *S. Stoliczkai* C. B. Clarke, *Compos. Ind.*, p. 225.

Hab. — Environs de Mang-rtsé, alt. 5,200 mètres.

45. *S. cinerea* sp. nov.

(*Caulescentes* Hook. fil. *Flor. of Brit. Ind.*, III, 368). — Tota laxa arachnoidea, cinerascens ; *caulis abbreviatus*, 3-8 cent. altus, *monocephalus*, *foliosus* ; *folia linearia*, 2-3 poll. longa, *marginibus revolutis*, nunc integer-