

51. *Statice aurea* L., sp. pl. (Ed. 1), p. 276.

*Hab.* — Souget Boulak. — Nom indigène, Ylimtchak.

52. *Pleurogyne Thompsoni* Clarke in Hooker fil. *Flora of Brit. Ind.*, IV, p. 120.

*Hab.* — Col Koutaslyk, alt. 5,400 mètres, 18 août 1892.

53. *Gentiana tenella* Fries in *Act. Hafn.*, X, p. 436, tab. 2, fig. 6.

*Hab.* — Versant nord du col de Hatamning, 19 août 1892.

Fleurs d'un bleu pâle avec des bandes plus foncées sur le tube; lobes environ deux fois plus courts que le tube; calice à divisions inégales, les plus longues lancéolées aiguës, les plus courtes (2 ou 3) ovales obtuses, moitié plus courtes que le tube de la corolle. C'est une forme intermédiaire entre le *G. tenella* et le *G. falcata*.

54. *G. tenella* Fries.

Var. *lutchensis*. — Pollicaris; e basi ramosissima, ramis unifloris; flores violacei, 6-7 mm. longi, lobis obtusissimis tubum æquantibus; faucis fimbriæ lobis paulo breviores; calycis segmenta longiora tubum fere æquantia, acuta.

*Hab.* — Bassin du Loutch. — Nom vernac., *Soussoum*.

Port du *G. azurea*, mais plus trappu et plus diffus, les cils de la gorge sont nombreux et bien développés. C'est une forme bien caractérisée par ses petites fleurs à tube court et à limbe étalé; constitue peut-être une espèce particulière.

55. *G. Karelini* Griseb. in *D. C. Prodr.*, IX, 106.

*Hab.* — Le côté sud du col de Hatam, sur la Kéria daria, 19 août 1892. Col Koutaslyk, alt. 5,500 mètres, 12 août 1892.

Petite plante à tige presque nulle; les divisions du calice sont très obtuses dans les spécimens de Koutaslyk.

56. *Eritrichium pulchellum* C. B. Clarke in Hook. fil, *Flor. of Brit. Ind.*, IV, p. 165.

*Hab.* — Versant nord du col de Hatam.; 19 août 1892.

Forme plus diffuse que le type du Sikkim, mais ne pouvant d'ailleurs en être séparée à aucun titre.

57. *Tretocarya pratensis* Maxim., *Mél. biol.*, XI, 272.

*Hab.* — Versant nord du col de Hatam., 19 août 1892; bords du lac Pang-kong, 24 septembre 1892.